

PIJNMANAGEMENT BIJ KINDEREN

Het plaatselijk verdoven van de huid om pijn te verlichten

INDICATIES:

Lokale verdoving van de huid bij naaldgerelateerde ingrepen, zoals:

- Venapunctie
- Injecties
- Aanprikken Porth-A-Cath (PAC)
- Plaatsen infuus
- Lumbaal punctie (LP)
- Puncties (i.c.m. systemische analgesie)



EMLA[®] 5%



Vanaf 0 jaar (bij prematuren vanaf 37 weken p.c.)



Minimaal 60 minuten voor de ingreep
(90 min bij LP)



Maximaal 5 uur laten zitten (maximaal 1 uur bij kinderen jonger dan 1 jaar)



Werkt na verwijderen nog 2 uur door



RAPYDAN[®]



Vanaf de leeftijd van 3 jaar



Minimaal 30 minuten voor de ingreep



Maximaal 2 uur laten zitten



Werkt na verwijderen nog 3 uur door



1. Plak de verdovende pleisters zodra gedacht wordt aan een punctie, de diepte van de verdoving neemt toe met de duur van de inwerktijd
2. Plak op meerdere plekken tegelijk wanneer mogelijk meerdere punctieplekken nodig zijn, zie farmacotherapeutisch kompas voor max dosering en contra indicaties
3. Zorg bij stuggere kant en klaar pleisters dat de crème goed contact houdt met de huid
4. Zorg voor warme ledematen bij venapunctie of infuus
5. Witte verkleuring van de huid na Emla gebruik trekt ca 15 minuten na verwijderen weg

PR@SA



from fear to trust

www.prosanetwork.com



Het farmacotherapeutisch kompas